


NSCLC 患者定量調査 Report

< 患者さんは治療に対する不安をどう感じているか？ >



調査設計

調査対象

現在治療中もしくは治療終了1年未満の進行・再発非小細胞肺癌患者さん
(進行=ステージⅢbもしくはⅣ、再発=ステージ0~Ⅲaで再発あり)

下記の患者さんに対して、アンケートの協力を依頼

- ・がん情報サイト「オンコロ」へ訪問した患者
- ・肺癌患者会「ワンステップ!」の会員

サンプル数

110名

調査方法


WEBサイト「オンコロ」にて募集を行い、インターネットによるアンケート調査を実施

調査期間

2018年6月18日~26日


性別

(n=110)




年代

(n=110)




進行／再発

(n=110)



EGFR遺伝子変異

(n=110) ※Q1遺伝子検査をしたか不明な6名を含む




対象者情報

Unit:%

通院施設 (n=110)

■ がんセンター ■ 大学病院 ■ 国公立病院 ■ その他の病院




治療期間

※再発患者は再発してからの期間

(n=110)


■ 1年未満 ■ 1-2年未満 ■ 2-3年未満 ■ 3-5年未満 ■ 5-10年未満 ■ 10年以上



有職／無職


(n=110)

- 有職
- 無職



(有職者) 働いている日数/週

(n=55)



Summary

治療説明 & 薬剤への期待

一番最初に受けた薬剤治療を開始する際の治療の情報を入手方法は、「医師から説明」が96%であり、次いで、「薬剤師からの説明」(42%)、「製薬会社からのHP」(38%)であった。

最初の薬剤治療を決める際、7割近い患者(68%)が医師からの説明を理解したと回答したが、一方で自分の考えや意見を伝えたと回答した患者は半数以下(44%)にすぎない。ただし、7割以上の患者(71%)が治療決定プロセスに満足している。

がんの薬剤治療に期待することは、大半の患者が「効果の継続」(96%)と回答した。
一方、避けたい副作用としては、「吐き気/嘔吐」(30%)、「脱毛」(24%)が上位に挙げられた。

治療開始時/変更時の不安


治療を開始するとき、変更するとき、それぞれのシーンにおける治療そのものに対する不安、治療による生活の変化に対する不安について確認した。

	開始時	変更時
治療に対する不安	最初の治療は、 副作用がつかないか：88% 効果が長続きするか：86%	次の治療は、 どんな副作用があるか：83% 効果があるのか：77%
生活の変化に対する不安	がんの治療によって、 周りに迷惑をかけてしまう：81% 仕事や家事等の制限：79%	次の治療によって、 仕事や家事等の制限：68% 周りに迷惑をかけてしまう：63%

治療説明 & 薬剤への期待

治療変更回数


Q 今までに何回、薬を変更してきましたか？ ※再発患者については、再発後の治療について確認



薬剤変更経験あり **63%**


(n=110)

Q 一番最初に受けた薬剤治療を開始する際、どのようにして治療の情報を入手しました？



Q 一番最初に受けた薬剤治療を開始する際、どのような説明がありましたか？

※再発患者については、再発後の治療について確認




治療決定の際の医師とのコミュニケーション

Unit:%

Q 一番最初に受けた薬剤治療を決める際・・・


医師からの説明を
どの程度理解しましたか？



(n=110)


- 十分に理解できた
- ↑
- どちらとも言えない
- ↓
- 全く理解できなかった

自分の考えや意見を
医師にどの程度伝えること
ができましたか？



- 十分に伝えることができた
- ↑
- どちらとも言えない
- ↓
- 全く伝えることができなかった

決定のプロセスに対して
どの程度満足されていますか？




- 十分に満足している
- ↑
- どちらとも言えない
- ↓
- 全く満足していない

治療への期待

Q がんの薬剤治療に期待することは何ですか？


※上位3項目を確認したが、下記の結果は1位に上がった項目



避けたい副作用

Q がんの治療で、できれば避けたい薬剤治療の副作用は何ですか？

※上位3項目を確認したが、下記の結果は1位に上がった項目で5%以上の回答のみ表示




治療を開始する前の不安

治療を開始する前の不安

治療に対する不安

Q 一番最初に受ける薬剤治療を開始する前、治療に対してどのような不安がありましたか？



治療を開始する前の不安 <治療に対する不安>

治療に対する不安

Q 一番最初に受ける薬剤治療を開始する前、治療に対してどのような不安がありましたか？



治療変更なし

(n=41)

効果が長続きするのかわという不安




副作用でつらい治療になるのではないかわという不安



治療費がどれくらいかかるのかわという不安



通院回数・時間等に費やす時間が多くなるのではないかわという不安



治療変更1回以上

(n=69)


効果が長続きするのかわという不安



副作用でつらい治療になるのではないかわという不安



治療費がどれくらいかかるのかわという不安





通院回数・時間等に費やす時間が多くなるのではないかわという不安



治療を開始する前の不安 <治療に対する不安>

治療に対する不安


Q 一番最初に受ける薬剤治療を開始する前、治療に対してどのような不安がありましたか？



治療を開始する前の不安

生活の変化に対する不安

Q 一番最初に受ける薬剤治療を開始する前、治療によって生活の変化に対してどのような不安がありましたか？



治療を開始する前の不安 <生活の変化に対する不安>

生活の変化に対する不安

Q 一番最初に受ける薬剤治療を開始する前、治療によって生活の変化に対してどのような不安がありましたか？



治療変更なし

(n=41)

通院回数や副作用によって、仕事や家事等の「出来ること」が制限されるかもしれない不安




家族や職場の人など、周りの人に負担をかけることになるかもしれない不安



自分が病気であることを常に考えさせられるかもしれないという不安



治療費用が掛かることによって、生活が圧迫されるかもしれない不安



治療変更1回以上

(n=69)

通院回数や副作用によって、仕事や家事等の「出来ること」が制限されるかもしれない不安



家族や職場の人など、周りの人に負担をかけることになるかもしれない不安



自分が病気であることを常に考えさせられるかもしれないという不安




治療費用が掛かることによって、生活が圧迫されるかもしれない不安



治療を開始する前の不安 <生活の変化に対する不安>

生活の変化に対する不安

Q 一番最初に受ける薬剤治療を開始する前、治療によって生活の変化に対してどのような不安がありましたか？




治療変更に対する不安

治療変更に対する不安

治療に対する不安

一番最初に受けた薬剤治療を変更する際、新しい治療に関してどのような不安を感じましたか？



治療変更に対する不安


治療に対する不安

一番最初に受けた薬剤治療を変更する際、新しい治療に関してどのような不安を感じましたか？




EGFR m+

(n=40)



EGFR m-/不明


(n=27)



治療変更に対する不安

生活の変化に対する不安

Q 一番最初に受けた薬剤治療を変更する際、新しい治療によって生活の変化に対してどのような不安を感じましたか？



治療変更に対する不安

生活の変化に対する不安

Q 一番最初に受けた薬剤治療を変更する際、新しい治療によって生活の変化に対してどのような不安を感じましたか？




EGFR m+

(n=40)


次の薬剤の通院回数や副作用によって、仕事や家事等の「出来ること」が制限されるかもしれない不安




次の薬剤によって、家族や職場の人など、周りの人に負担をかけることになるかもしれない不安



次の薬剤によって、自分が病気であることを常に考えさせられるかもしれないという不安



次の治療の治療費用が掛かることによって、生活が圧迫されるかもしれない不安



EGFR m-/不明

(n=27)


次の薬剤の通院回数や副作用によって、仕事や家事等の「出来ること」が制限されるかもしれない不安




次の薬剤によって、家族や職場の人など、周りの人に負担をかけることになるかもしれない不安



次の薬剤によって、自分が病気であることを常に考えさせられるかもしれないという不安




次の治療の治療費用が掛かることによって、生活が圧迫されるかもしれない不安



治療変更に対する不安の程度

Q 2回目の変更時、初回の治療変更と比べて、不安を感じる程度はいかがでしたか？


- 初回の治療変更の方が不安であった
- 不安の程度は変わらなかった
- 2回目の方が不安であった



(n=38)

治療中に安心するとき

Q 治療を受けてる（受けていた）中で、どのようなときに安心されますか？



治療中に大切にしていること

Q 治療を受けてる（受けていた）中、日常生活でどのようなことを大切にされていますか？ (n=110)

※自由回答をまとめた結果

生活スタイル面に関する回答

- ✓ 変わらない生活をする
／普段どおり過ごす（仕事や趣味など）：34名
- ✓ 食事をきちんととる／体調管理／適度な運動：24名
- ✓ 家族や友人との時間を大切にす：21名
- ✓ やりたいこと／好きなことをやる／楽しむ：19名
- ✓ 無理をしない／自分のペースで過ごす：6名

感情面に関する回答

- ✓ 前向きな気持ちを持つ／明るく過ごす：13名
- ✓ ストレスをためない／リラックスする：7名
- ✓ 病気のことを考えない：8名
- ✓ 感謝の気持ちを持つ：6名